

予 防 接 種 名	対 象 者	接 種 回 数																																	
ロタ (ロタリックス)	出生6週0日後から24週0日後	どちらかひとつ 27日以上の間隔をあけて2回 出生14週6日後までに 初回接種をします。																																	
ロタ (ロタテック)	出生6週0日後から32週0日後																																		
小児用肺炎球菌	生後2か月～5歳未満	1～4回																																	
		接種開始時の月・年齢で回数異なります																																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">接種開始時の年齢 (月齢)</th> <th colspan="3">初回接種</th> <th rowspan="2">追加</th> <th rowspan="2">接種回数</th> </tr> <tr> <th>1回目</th> <th>2回目</th> <th>3回目</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>生後2か月から7か月未満</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>4回</td> </tr> <tr> <td>生後7か月から12か月未満</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>△</td> <td>○</td> <td>3回</td> </tr> <tr> <td>1歳以上2歳未満</td> <td colspan="3">2回 (2か月以上の間隔)</td> <td></td> <td>2回</td> </tr> <tr> <td>2歳以上5歳未満</td> <td colspan="3">1回</td> <td></td> <td>1回</td> </tr> </tbody> </table>	接種開始時の年齢 (月齢)	初回接種			追加	接種回数	1回目	2回目	3回目	生後2か月から7か月未満	○	○	○	○	4回	生後7か月から12か月未満	○	○	△	○	3回	1歳以上2歳未満	2回 (2か月以上の間隔)				2回	2歳以上5歳未満	1回				1回
		接種開始時の年齢 (月齢)		初回接種					追加	接種回数																									
			1回目	2回目	3回目																														
生後2か月から7か月未満	○	○	○	○	4回																														
生後7か月から12か月未満	○	○	△	○	3回																														
1歳以上2歳未満	2回 (2か月以上の間隔)				2回																														
2歳以上5歳未満	1回				1回																														
B型肝炎	1歳未満 (標準的な時期は生後2～9か月に至るまで)	初回：27日以上あけて2回 追加：1回目の接種から139日 (20週) 以上あけて1回																																	
五種混合 (ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・ヒブ)	生後2～90か月に至るまで	1期初回：20日以上あけて3回 1期追加：1期初回終了後6か月～1年半後に1回																																	
三種混合 (ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)	生後2～90か月に至るまで	1期初回：20日以上あけて3回 1期追加：1期初回終了後1～1年半後に1回																																	
ヒブ	生後2か月～5歳未満	1～4回																																	
		接種開始時の月・年齢で回数異なります																																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">接種開始時の年齢 (月齢)</th> <th colspan="3">初回接種</th> <th rowspan="2">追加</th> <th rowspan="2">接種回数</th> </tr> <tr> <th>1回目</th> <th>2回目</th> <th>3回目</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>生後2か月から7か月未満</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>4回</td> </tr> <tr> <td>生後7か月から12か月未満</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>△</td> <td>○</td> <td>3回</td> </tr> <tr> <td>1歳以上5歳未満</td> <td>○</td> <td>△</td> <td>△</td> <td>△</td> <td>1回</td> </tr> </tbody> </table>	接種開始時の年齢 (月齢)	初回接種			追加	接種回数	1回目	2回目	3回目	生後2か月から7か月未満	○	○	○	○	4回	生後7か月から12か月未満	○	○	△	○	3回	1歳以上5歳未満	○	△	△	△	1回						
		接種開始時の年齢 (月齢)		初回接種					追加	接種回数																									
			1回目	2回目	3回目																														
生後2か月から7か月未満	○	○	○	○	4回																														
生後7か月から12か月未満	○	○	△	○	3回																														
1歳以上5歳未満	○	△	△	△	1回																														
不活化ポリオ	生後2～90か月に至るまで	1期初回：3週間以上の間をあけて3回 ※生ポリオ1回接種された方は2回 1期追加：初回終了後1～1年6か月の間に1回																																	
BCG (結核)	1歳未満 (標準的な時期は生後5～8か月に至るまで)	1回																																	
MR (麻しん・風しん混合)	1期：生後12～24か月に至るまで 2期：小学校入学前1年間	各期1回 ※どちらかの病気にかかった、もしくは特に希望される場合には麻しん・風しんワクチンを別々に接種できます。																																	
水痘 (水ぼうそう)	生後12～36か月に至るまで	6～12か月の間隔で2回																																	
日本脳炎	生後36～90か月に至るまで	1期初回：6日～28日間隔で2回 1期追加：1期初回終了後おおむね1年後に1回 (11～13か月の間)																																	
	9歳以上13歳未満	2期：小学校4年生で1回																																	
二種混合 (破傷風・ジフテリア)	11歳以上13歳未満	2期：小学校6年生で1回																																	
子宮頸がんワクチン	中学1年生～高校1年生に相当する年齢の女子	合計2回または3回 (※9価ワクチンを15歳の誕生日の前日までに1回目接種した方は合計2回接種で完了)																																	

●次の予防接種までの間隔について

生ワクチンの注射から、次の生ワクチンの注射までは、27日以上あけて 接種してください。

